

**3ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE INT. À TEORIA DAS PROB. - SME0220**

**Exercício 1** (Hines et. al. E. 4-1, p. 90). Um fabricante de refrigeradores submete seus produtos acabados a uma inspeção final. Duas categorias de defeitos são de interesse: arranhões ou falhas no acabamento da porcelana e defeitos mecânicos. O número de cada tipo de defeito é uma variável aleatória. Os resultados da inspeção de 50 refrigeradores estão mostrados na tabela seguinte, em que  $X$  representa a ocorrência de defeitos de acabamento e  $Y$  representa a ocorrência de defeitos mecânicos.

$Y \setminus X$	0	1	2	3	4	5
0	11/50	4/50	2/50	1/50	1/50	1/50
1	8/50	3/50	2/50	1/50	1/50	
2	4/50	3/50	2/50	1/50		
3	3/50	1/50				
4	1/50					

- (a) Ache as distribuições marginais de  $X$  e  $Y$ .
- (b) Ache a distribuição de probabilidade dos defeitos mecânicos, dado que não há defeitos de acabamento.
- (c) Ache a distribuição de probabilidade dos defeitos de acabamento dado que não há defeitos mecânicos.

**Exercício 2** (Hines et. al. E. 4-3, p. 91). Sejam  $X_1$  e  $X_2$  os escores em um teste de inteligência geral e em um teste de preferência ocupacional, respectivamente. A função de densidade de probabilidade das variáveis aleatórias  $[X_1, X_2]$  é dada por

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{k}{1000}, & 0 \leq x_1 \leq 100, 0 \leq x_2 \leq 10, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Ache o valor apropriado de  $k$ .
- (b) Ache as densidades marginais de  $X_1$  e  $X_2$ .
- (c) Ache a expressão para a função de distribuição acumulada  $F(x_1, x_2)$ .

**Exercício 3** (Hines et. al. E. 4-4, p. 91). Considere uma situação em que se medem a tensão superficial e a acidez de um produto químico. Essas variáveis são codificadas de tal modo que a tensão superficial é medida em uma escala  $0 \leq X_1 \leq 2$  e a acidez é a medida em uma escala  $2 \leq X_2 \leq 4$ . A função de densidade de probabilidade de  $(X_1, X_2)$  é

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} k(6 - x_1 - x_2), & 0 \leq x_1 \leq 2, 2 \leq x_2 \leq 4, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Ache o valor apropriado de  $k$ .

- (b) Calcule a probabilidade de  $X_1 < 1, X_2 < 3$ .
- (c) Calcule a probabilidade de  $X_1 + X_2 \leq 4$ .
- (d) Ache a probabilidade de  $X_1 < 1, 5$ .
- (e) Ache as densidades marginais de  $X_1$  e de  $X_2$ .

**Exercício 4** (Hines et. al. E. 4-6, p. 91). Suponha que a densidade conjunta de  $(X, Y)$  seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(6 - x - y), & 0 \leq x_1 \leq 2, 2 \leq x_2 \leq 4, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Ache as densidades condicionais  $f_{X|Y}(x)$  e  $f_{Y|X}(y)$ .

**Exercício 5** (Hines et. al. E. 4-33, p. 93). Suponha que  $X$  e  $Y$  sejam variáveis aleatórias que denotam a fração de um dia em que ocorre o pedido de mercadoria e a fração do dia em que ocorre o recebimento de um carregamento, respectivamente. A função densidade de probabilidade conjunta é

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Qual é a probabilidade de que ambos, o pedido de mercadoria e o recebimento de um carregamento, ocorram na primeira metade do dia?
- (b) Qual é a probabilidade de que um pedido de mercadoria ocorra depois do seu recebimento? Antes do seu recebimento?

**Exercício 6** (Walpole et. al. E. 3.55, p. 66). A função de densidade conjunta das variáveis  $X$  e  $Y$  é

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 - x, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Mostre que  $X$  e  $Y$  não são independentes.
- (b) Determine  $P(X > 0, 3|Y = 0, 5)$ .

**Exercício 7** (Walpole et. al. E. 3.55, p. 66). Considere a seguinte função de densidade de probabilidade conjunta para as variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  é

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x-y}{9}, & 1 < x < 3, 1 < y < 2, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Determine as funções de densidade marginais de  $X$  e  $Y$ .
- (b)  $X$  e  $Y$  são independentes?
- (c) Determine  $P(X > 2)$ .