

## Caminhos mínimos Parte II

Profa. Debora Medeiros

Baseado nos slides da Profa. Rosane Minghin

## Complexidade Dijkstra (Cormen, 2001; MIT OpenCourseWare)

```

DIJKSTRA( $G, w, s$ )
1 INITIALIZE-SINGLE-SOURCE( $G, s$ )
2  $S \leftarrow \emptyset$ 
3  $Q \leftarrow V[G]$ 
4 while  $Q \neq \emptyset$ 
5     do  $u \leftarrow \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
6      $S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
7     for each vertex  $v \in \text{Adj}[u]$ 
8         do RELAX( $u, v, w$ )
    
```

$O(V)$  vezes  $\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{array} \right.$

$O(E)$  DECREASE-KEY's implícitos

$$\text{Tempo} = V \cdot T_{\text{EXTRACT-MIN}} + E \cdot T_{\text{DECREASE-KEY}}$$

2

## Complexidade Dijkstra (Cormen, 2001; MIT OpenCourseWare)

$$\text{Tempo} = V \cdot T_{\text{EXTRACT-MIN}} + E \cdot T_{\text{DECREASE-KEY}}$$

$Q$	$T_{\text{EXTRACT-MIN}}$	$T_{\text{DECREASE-KEY}}$	Total
array	$O(V)$	$O(1)$	$O(V^2)$
binary heap	$O(\lg V)$	$O(\lg V)$	$O(E \lg V)$

3


## Caminhos entre todos os pares

- **Entrada:** Grafo direcionado  $G = (V, E)$ , com uma função de peso  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ .
- **Saída:** matriz  $n \times n$  com os pesos dos menores caminhos  $\delta(i, j)$  entre todos os vértices  $i, j \in V$ .


4

## Floyd-Warshall

- O algoritmo de Floyd-Warshall determina as distâncias dos menores caminhos entre todos os pares de vértices de um grafo.
- Trabalha com arestas com pesos negativos.
- Mas não funciona quando existem ciclos negativos no grafo.



Ok! Grafo sem ciclo negativo



Nada feito. Grafo com ciclo negativo (arestas vermelhas)

5

## Floyd-Warshall


- **Ideia**
  - $d_{ij}^{(k)}$ : peso do menor caminho do vértice  $i$  ao vértice  $j$  cujos vértices intermediários pertencem ao conjunto  $\{1, 2, \dots, k\}$
  - Começar com  $k=0$  e ir atualizando a matriz incrementando o valor de  $k$ , ou seja, inserindo mais um vértice no conjunto de vértices intermediários permitidos.

$$d_{ij}^{(k)} = \begin{cases} w_{ij} & \text{if } k = 0, \\ \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}) & \text{if } k \geq 1. \end{cases}$$

6

## Floyd-Warshall (Cormen, 2001; MIT OpenCourseWare)

$$d_{ij}^{(k)} = \begin{cases} w_{ij} & \text{if } k = 0, \\ \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}) & \text{if } k \geq 1. \end{cases}$$



7

## Floyd-Warshall (Cormen, 2001)

- $W$ : matriz representando os pesos das arestas:

$$w_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{if } i = j, \\ \text{the weight of directed edge } (i, j) & \text{if } i \neq j \text{ and } (i, j) \in E, \\ \infty & \text{if } i \neq j \text{ and } (i, j) \notin E. \end{cases}$$


- Algoritmo:

```

FLOYD-WARSHALL( $W$ )
1  $n \leftarrow \text{rows}[W]$ 
2  $D^{(0)} \leftarrow W$ 
3 for  $k \leftarrow 1$  to  $n$ 
4   do for  $i \leftarrow 1$  to  $n$ 
5     do for  $j \leftarrow 1$  to  $n$ 
6       do  $d_{ij}^{(k)} \leftarrow \min(d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)})$ 
7 return  $D^{(n)}$ 
    
```


8

## Exemplo de Floyd-Warshall



9

## Exemplo de Floyd-Warshall



$$D^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 5 \\ 3 & 0 & \infty \\ \infty & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 5 \\ 3 & 0 & 8 \\ \infty & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 5 \\ 3 & 0 & 8 \\ 5 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 5 \\ 3 & 0 & 8 \\ 5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$


10

## Floyd-Warshall (Cormen, 2001; MIT OpenCourseWare)

- Caminho?

–  $\pi_{ij}$ : predecessor do vértice  $j$  no menor caminho de  $i$  para  $j$  com todos os intermediários pertencendo ao conjunto  $\{1, 2, \dots, k\}$ .


$$\pi_{ij}^{(0)} = \begin{cases} \text{NIL} & \text{if } i = j \text{ or } w_{ij} = \infty, \\ i & \text{if } i \neq j \text{ and } w_{ij} < \infty. \end{cases}$$



$$\pi_{ij}^{(k)} = \begin{cases} \pi_{ij}^{(k-1)} & \text{if } d_{ij}^{(k-1)} \leq d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}, \\ \pi_{kj}^{(k-1)} & \text{if } d_{ij}^{(k-1)} > d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}. \end{cases}$$

11


## Exemplo de Floyd-Warshall Armazenando caminho



- Quadro...


12

## Exemplo de Floyd-Warshall Armazenando caminho (Cormen, 2001)



13

## Exemplo de Floyd-Warshall Armazenando caminho (Cormen, 2001)



$$\begin{aligned}
 D^{(0)} &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ 2 & \infty & -5 & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 6 & 0 \end{pmatrix} & \Pi^{(0)} &= \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ 4 & \text{NIL} & 4 & \text{NIL} & \text{NIL} \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} & D^{(1)} &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 11 \\ \infty & \infty & -5 & 0 & -2 \end{pmatrix} & \Pi^{(1)} &= \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & 2 & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} \\
 D^{(2)} &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 11 \\ 2 & 5 & -5 & 0 & -2 \end{pmatrix} & \Pi^{(2)} &= \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & 2 & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} & D^{(3)} &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & 4 & -4 \\ 3 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 7 & 4 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & -2 \end{pmatrix} & \Pi^{(3)} &= \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & \text{NIL} & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & \text{NIL} & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \end{pmatrix} \\
 D^{(4)} &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & 4 & -4 \\ \infty & 0 & \infty & 1 & 7 \\ \infty & 4 & 0 & 5 & 11 \\ 2 & 5 & -5 & 0 & -2 \end{pmatrix} & \Pi^{(4)} &= \begin{pmatrix} \text{NIL} & 1 & 1 & 2 & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 4 & \text{NIL} & 1 \\ \text{NIL} & \text{NIL} & \text{NIL} & 5 & \text{NIL} \end{pmatrix} & D^{(5)} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 2 & -4 \\ 3 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 7 & 4 & 0 & 5 & 3 \\ 2 & -1 & -5 & 0 & -2 \end{pmatrix} & \Pi^{(5)} &= \begin{pmatrix} \text{NIL} & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & \text{NIL} & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & \text{NIL} & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 4 & \text{NIL} & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

14

## Complexidade Floyd-Warshall (Cormen, 2001)

FLOYD-WARSHALL( $W$ )

```

1  n ← rows[W]
2  D(0) ← W
3  for k ← 1 to n
4    do for i ← 1 to n
5      do for j ← 1 to n
6        do dij(k) ← min(dij(k-1), dik(k-1) + dkj(k-1))
7  return D(n)

```

- $O(n^3)$ 
  - $n$  = número de vértices
- Simples de codificar
- Eficiente na prática

15