

Algoritmo de Metropolis-Hastings por componentes

2020

Um vetor aleatório $(X_1, X_2)^\top$ tem função densidade

$$f(x_1, x_2) \propto \frac{(x_1 x_2)^5}{2^{x_1 - 1}} \left(1 - \frac{1}{2^{x_1}}\right)^{x_2 - 1} \exp(- (5x_1 + 7x_2)), \quad (1)$$

se $x_1 > 0$ e $x_2 > 0$; $f(x_1, x_2) = 0$, caso contrário.

Será apresentado um gerador de amostras do vetor $(X_1, X_2)^\top$ em linguagem R.

```
# Separador decimal: ", "  
options(OutDec = ", ")
```

A partir da expressão (1), as distribuições condicionais completas têm funções densidade tais que


$$f_1(x_1) = f(x_1|x_2) \propto \frac{x_1^5}{2^{x_1}} \left(1 - \frac{1}{2^{x_1}}\right)^{x_2 - 1} \exp(-5x_1) \quad (2)$$

e

$$f_2(x_2) = f(x_2|x_1) \propto x_2^5 \left(1 - \frac{1}{2^{x_1}}\right)^{x_2} \exp(-7x_2). \quad (3)$$


Os núcleos das funções em (2) e (3) não correspondem a distribuições conhecidas, pelo menos de imediato (vide Nota 2, pag. 11). Os gráficos abaixo correspondem a $x_2 = 1$ e $x_1 = 1$, respectivamente.

```
# Núcleos das distribuições condicionais completas  
f1 <- function(x1, x2) {  
  return(x1^5 * (1 - 1 / 2^x1)^(x2 - 1) * exp(-5 * x1) / 2^x1)  
}  
  
curve(f1(x, x2 = 1), xlab = expression(x[1]), 0, 3,  
      ylab = expression(paste("Núcleo de ", f[1](x[1]))))
```



```
f2 <- function(x2, x1) {
  return(x2^5 * (1 - 1 / 2^x1)^x2 * exp(-7 * x2))
}

curve(f2(x, x1 = 1), xlab = expression(x[2]), 0, 3,
      ylab = expression(paste("Núcleo de ", f[2](x[2]))))
```



Utilizamos o algoritmo de Metropolis-Hastings por componentes. Tanto em (2) quanto em (3) adotamos uma distribuição proposta $\text{gama}(ax, a)$ com esperança $ax/a = x$ e variância $ax/a^2 = x/a$, sendo que a seleção do valor de a está relacionada com a taxa de aceitação dos candidatos gerados.

```

# Constantes para o amostrador
set.seed(3316)
descarte <- 500
espac <- 1
M <- 2000
nsim <- descarte + espac * M

# Distribuição proposta: gama(forma = a * x, taxa = a)
a10 <- 1
a20 <- 2

# Valores iniciais
x1 <- x2 <- c()
x1[1] <- 0.5
x2[1] <- 1

# Contadores de aceitações
nac1 <- nac2 <- 0

# Simulação
for (j in 2:nsim) {
  # candidato x1
  y1 <- rgamma(1, shape = a10 * x1[j - 1], rate = a10)

  # probabilidade x1
  alfa <- min(1, f1(y1, x2[j - 1]) * dgamma(x1[j - 1], a10 * y1,
    rate = a10) / (f1(x1[j - 1], x2[j - 1]) * dgamma(y1, a10 *
    x1[j - 1], rate = a10)))

  # geração x1
  if (runif(1) <= alfa) {
    x1[j] <- y1
    nac1 <- nac1 + 1
  } else {
    x1[j] <- x1[j - 1]
  }

  # candidato x2
  y2 <- rgamma(1, shape = a20 * x2[j - 1], rate = a20)

  # probabilidade x2
  alfa <- min(1, f2(y2, x1[j]) * dgamma(x2[j - 1], a20 * y2,
    rate = a20) / (f2(x2[j - 1], x1[j]) * dgamma(y2, a20 *
    x2[j - 1], rate = a20)))

  # geração x2
  if (runif(1) <= alfa) {
    x2[j] <- y2
    nac2 <- nac2 + 1
  } else {
    x2[j] <- x2[j - 1]
  }
}

```

```
cat("\n Taxa de aceitação de X1 (%):", round(nac1 / (nsim - 1) * 100, 1))
```

```
##
```

```
## Taxa de aceitação de X1 (%): 41,1
```

```
cat("\n Taxa de aceitação de X2 (%):", round(nac2 / (nsim - 1) * 100, 1))
```

```
##
```


```
## Taxa de aceitação de X2 (%): 44,8
```

Em seguida as sequências geradas são apresentadas graficamente.


```
## Gráficos
```

```
# Sequência
```


```
plot(x1, type = "l", xlab = "Iteração", ylab = expression(X[1]), col = 4)
```




```
plot(x2, type = "l", xlab = "Iteração", ylab = expression(X[2]), col = 4)
```



```
# Médias ergódicas
plot(cumsum(x1) / (1:nsim), type = "l", xlab = "Iteração",
     ylab = expression(paste("Média ergódicas de ", X[1])))
abline(v = descarte, lty = 2, col = "red")
```




```
plot(cumsum(x2) / (1:nsim), type = "l", xlab = "Iteração",
     ylab = expression(paste("Média ergódicas de ", X[2])))
abline(v = descarte, lty = 2, col = "red")
```




```
# Autocorrelação
acf(x1, lag.max = 10, main = expression(X[1]), xlab = "Defasagem",
    ylab = "Autocorrelação")
```

X_1



```
acf(x2, lag.max = 10, main = expression(X[2]), xlab = "Defasagem",
    ylab = "Autocorrelação")
```

X_2




Apresentamos resultados para as seqüências após levar em conta descarte (*burn-in*) e espaçamento (*thinning*).

```
# Amostras (descarte e espaçamento levados em conta)
indices <- seq(descarte + 1, nsim, by = espac)
x1 <- x1[indices]
x2 <- x2[indices]


for (nome in c("x1", "x2")) {
  cat("\n Estatísticas descritivas de", nome, "\n")
  print(summary(get(nome)))
}
```

```
##
## Estatísticas descritivas de x1
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 0,2573 0,7453 0,9989 1,0429 1,2836 2,8377
##
## Estatísticas descritivas de x2
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 0,1728 0,5326 0,7100 0,7560 0,9416 2,5942
```

```
# Sequência
plot(x1, type = "l", xlab = "Iteração", ylab = expression(X[1]), col = 4)
```




```
plot(x2, type = "l", xlab = "Iteração", ylab = expression(X[2]), col = 4)
```




```
# Autocorrelação
acf(x1, lag.max = 10, main = expression(X[1]), xlab = "Defasagem",
    ylab = "Autocorrelação")
```


X_1



```
acf(x2, lag.max = 10, main = expression(X[2]), xlab = "Defasagem",  
    ylab = "Autocorrelação")
```

X_2




```
# X1  
fhist <- hist(x1, plot = FALSE)
```

```

fdens <- density(x1)
inty <- c(0, max(fhists$density, fdens$y))
plot(fhists, freq = FALSE, main = "", xlab = expression(x[1]),
      ylab = "Densidade", ylim = inty)
lines(fdens, lty = 2, col = 99, lwd = 2)
box()


```



```

# X2
fhists <- hist(x2, plot = FALSE)
fdens <- density(x2)
inty <- c(0, max(fhists$density, fdens$y))
plot(fhists, freq = FALSE, main = "", xlab = expression(x[2]),
      ylab = "Densidade", ylim = inty)
lines(fdens, lty = 2, col = 99, lwd = 2)
box()

```



Nota 1. Modifique as constantes para o amostrador (pag. 3) de modo a obter seqüências menos autocorrelacionadas e com médias ergódicas mais estáveis em relação às que foram apresentadas.

Nota 2 Tomando $b_1 = 1 - 1/2^{x_1}$, o núcleo da função densidade na expressão (3) pode ser escrito como

$$\begin{aligned} x_2^5 b_1^{x_2} \exp(-7x_2) &= x_2^5 \{\exp(\log(b_1))\}^{x_2} \exp(-7x_2) = x_2^5 \exp(x_2 \log(b_1)) \exp(-7x_2) \\ &= x_2^5 \exp(-x_2 \{7 - \log(b_1)\}) = x_2^{6-1} \exp(-x_2 \{7 - \log(b_1)\}), \end{aligned}$$

de modo que a distribuição condicional completa de X_2 é gama com parâmetro de forma igual a 6 e parâmetro de taxa igual a

$$7 - \log(b_1) = 7 - \log\left(1 - \frac{1}{2^{x_1}}\right).$$

Refaça o exemplo utilizando este resultado.