



INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE

2011

Conceitos básicos

Experimento aleatório ou fenômeno aleatório

Situações ou acontecimentos cujos resultados não podem ser previstos com certeza.

Um experimento ou fenômeno que, se for observado em condições idênticas, pode apresentar diferentes resultados é chamado de experimento ou fenômeno aleatório.



Conceitos básicos

Exemplos

- Condições climáticas do próximo domingo.
- Taxa de inflação do próximo mês.
- Condição de um item produzido.
- Resultado do lançamento de um dado.
- Tempo de duração de uma lâmpada.
- Observação do número de veículos que passam por uma praça de pedágio durante um certo intervalo.

Conceitos básicos

Espaço amostral (Ω)

Conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento ou fenômeno aleatório.

Exemplos

1. Lançamento de um dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ou $\Omega = \{ \begin{array}{|c|} \hline \cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot \cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot \cdot \cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ \hline \end{array} \}$
2. Observação do tipo sanguíneo de um indivíduo: $\Omega = \{A, B, AB, 0\}$
3. Condição de um item produzido: $\Omega = \{\text{defeituoso, não defeituoso}\}$
4. Número de veículos que passam por uma praça de pedágio durante um certo intervalo: $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$
5. Tempo de duração de uma lâmpada (em h): $\Omega = (0, \infty)$

Exemplo

Lançamento de um dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Evento

Subconjunto do espaço amostral Ω .

Notação: A, B, C, \dots

Exemplos. Eventos do exemplo acima:


- A. Resultado é par: $A = \{2, 4, 6\}$ (evento composto)
- B. Resultado é maior do que 3: $B = \{4, 5, 6\}$ (evento composto)
- C. Resultado igual a 1: $C = \{1\}$ (evento simples)
- D. Resultado maior do que 6: $D = \emptyset$ (evento impossível)
- E. Resultado menor do que 7: $D = \Omega$ (evento certo)

Operações com eventos

A e B são eventos de Ω



- $A \cup B$: união dos eventos A e B

Ocorrência de pelo menos um dos eventos A e B.



Operações com eventos

- $A \cap B$: intersecção dos eventos A e B
Ocorrência simultânea dos eventos A e B.
- A e B são disjuntos ou mutuamente exclusivos quando não têm elementos em comum, isto é, $A \cap B = \emptyset$.
- A e B são complementares se $A \cap B = \emptyset$ e $A \cup B = \Omega$.
- O complementar de um evento A é representado por A^c ou \bar{A}



Interpretações de probabilidade

Probabilidade em espaços equiprováveis

Se um experimento aleatório tiver $n(\Omega)$ resultados mutuamente exclusivos e igualmente possíveis e, se um evento A tiver $n(A)$ desses resultados, a probabilidade do evento A, representada por $P(A)$, é dada por

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$


Exemplo. Lançamento de dois dados balanceados. Calcular a probabilidade de

- a) se obter soma das faces igual a 7,
- b) se obter soma maior do que 5,
- c) que o resultado do primeiro dado seja maior do que o resultado do segundo.


$$\Omega = \left\{ \begin{array}{cccccc} 1,1 & 1,2 & 1,3 & 1,4 & 1,5 & 1,6 \\ 2,1 & 2,2 & 2,3 & 2,4 & 2,5 & 2,6 \\ 3,1 & 3,2 & 3,3 & 3,4 & 3,5 & 3,6 \\ 4,1 & 4,2 & 4,3 & 4,4 & 4,5 & 4,6 \\ 5,1 & 5,2 & 5,3 & 5,4 & 5,5 & 5,6 \\ 6,1 & 6,2 & 6,3 & 6,4 & 6,5 & 6,6 \end{array} \right\}$$

a) $A = \{(6,1),(5,2),(4,3),(3,4),(2,5),(6,1)\}$

$\Rightarrow P(A) = n(A) / n(\Omega) = 6 / 36 = 1/6$



b) $P(B) = 26/36.$



c) $P(C) = 15/36$.

Interpretações de probabilidade

Probabilidade frequentista ou clássica

Um experimento é realizado n vezes (n “grande”). O evento A ocorre exatamente $n(A)$ vezes ($0 \leq n(A) \leq n$). A frequência relativa de vezes que ocorreu o evento A é uma forma de aproximar a probabilidade do evento A , ou seja,

$$f_r (A) = \frac{n (A)}{n}$$

Quando $n \rightarrow \infty$, $f_r(A)$ se aproxima de $P(A)$.

Exemplo. Lançamento de uma moeda balanceada. Calcular a probabilidade de $A = \{\text{resultado obtido é cara}\}$.

	f_{r1}	f_{r2}	f_{r3}	f_{r4}	...	$P(A)$
Cara	2/5	6/10	22/50	47/100	...	0,5
n	5	10	50	100	...	∞

Definições de probabilidade

Definição axiomática

A probabilidade de um evento A é definida como sendo um número $P(A)$ satisfazendo aos seguintes **axiomas**:

- (i) $0 \leq P(A) \leq 1, \forall A \subset \Omega$,
- (ii) $P(\Omega) = 1$,
- (iii) Se A_1, A_2, \dots são eventos mutuamente exclusivos, então

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Propriedades

1. $P(\Phi) = 0$.
2. Se $A \subset \Omega$, então $P(A) = 1 - P(A^c)$.
3. Se $A \subset B \subset \Omega$, então $P(A) \leq P(B)$.
4. Se $A, B \subset \Omega$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
5. Se $A, B, C \subset \Omega$, então $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$.

Probabilidade condicional e independência

A e B são dois eventos em um mesmo espaço amostral Ω . A **probabilidade condicional de A dado que ocorreu o evento B** , denotada por $P(A|B)$, é definida como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{se } P(B) > 0. \quad (1)$$

Exemplo. Seleccionamos dois itens, ao acaso, um a um e sem reposição, de um lote que contém 10 itens do tipo A e 5 do tipo B . Qual é a probabilidade de que

- (a) o primeiro item seja do tipo A ?
- (b) o segundo seja do tipo B se o primeiro item foi do tipo A ?

Definimos os eventos

V_1 : " o 1º item é do tipo A" ;

V_2 : " o 2º item é do tipo A"

$$(a) \quad P(V_1) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

$$(b) \quad P(V_2^c | V_1) = \frac{5}{14}$$

Essas probabilidades podem ser representados em uma **árvore de probabilidades**.

Árvore de probabilidades



Da expressão (1) obtém-se uma relação útil:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B),$$

conhecida como **regra do produto de probabilidades** ou **probabilidade da interseção**.

Exemplo. No exemplo anterior suponha que temos interesse em determinar a probabilidade de que os dois itens selecionados sejam do tipo B.

O evento é $V_1^c \cap V_2^c$: " o 1º e o 2º itens são do tipo B "

$$P(V_1^c \cap V_2^c) = P(V_1^c)P(V_2^c | V_1^c) = \frac{5}{15} \times \frac{4}{14} = \frac{2}{21}$$

Resultado. Se B é um evento em Ω tal que $P(B) > 0$, então

$$1. P(\phi | B) = 0$$

$$2. \text{Se } A \subset \Omega, \text{ então } P(A^c | B) = 1 - P(A | B) \text{ ou } P(A | B) = 1 - P(A^c | B)$$

$$3. \text{Se } A, C \subset \Omega, \text{ então}$$

$$P(A \cup C | B) = P(A | B) + P(C | B) - P(A \cap C | B).$$

Exemplo. Um representante avalia que sua probabilidade de realizar um bom negócio em um certo dia é 0,35 e a probabilidade de realizar bons negócios em dois dias consecutivos é 0,25.

Se um bom negócio foi realizado no primeiro dia, qual a probabilidade de que no dia seguinte não seja realizado um bom negócio ?

Solução. Definimos os eventos A: "um bom negócio é realizado no 1º dia" e B: " um bom negócio é realizado no 2º dia".

Do enunciado do problema temos $P(A) = 0,35$ e $P(A \cap B) = 0,25$. A probabilidade pedida é

$$P(B^c | A) = 1 - P(B | A) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 1 - \frac{0,25}{0,35} = 0,286.$$

Independência de eventos

Dois eventos A e B em Ω são independentes se a informação da ocorrência ou não de B não altera a probabilidade de ocorrência de A . Isto é,

$$P(A | B) = P(A), \quad P(B) > 0.$$

Logo, dois eventos A e B são independentes se, e somente se,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exemplo. Em uma fábrica 20% dos lotes produzidos têm componentes do fornecedor A , 8% têm componentes do fornecedor V e 4% têm componentes de ambos. Selecionamos ao acaso um item produzido nesta fábrica.

- Os eventos relacionados aos dois fornecedores são independentes?
- Se o lote selecionado tem componentes do fornecedor V , qual a probabilidade de que tenha componentes do fornecedor A ?
- Qual é a probabilidade de um lote não ter componentes destes dois fornecedores?

Solução. A : “o lote tem componentes do fornecedor A ”, V : “o lote tem componentes do fornecedor V ”.

Do enunciado temos $P(A) = 0,20$, $P(V) = 0,08$ e $P(A \cap V) = 0,04$.

$$(a) \quad P(V)P(A) = 0,08 \times 0,2 = 0,016 \quad e$$

$$P(V \cap A) = 0,04.$$

Como $P(V \cap A) \neq P(V)P(A)$, A e V não são independentes.

$$(b) \quad P(A|V) = \frac{P(A \cap V)}{P(V)} = \frac{0,04}{0,08} = 0,50.$$

$$\begin{aligned} (c) \quad P((V \cup A)^c) &= 1 - P(V \cup A) \\ &= 1 - \{P(V) + P(A) - P(V \cap A)\} \\ &= 1 - (0,08 + 0,2 - 0,04) = 0,76. \end{aligned}$$

Resultado. Se A e B são eventos independentes em Ω , então

- (i) A e B^c são independentes.
- (ii) A^c e B são independentes
- (iii) A^c e B^c são independentes

Exemplo. Um atirador acerta 80% de seus disparos e outro (nas mesmas condições de tiro), 70%. Qual a probabilidade de o alvo ser acertado se ambos os atiradores dispararem simultaneamente?

Eventos: B_i : "o atirador i acerta o alvo", $i = 1, 2$.

$P(B_1) = 0,8$ e $P(B_2) = 0,7$. Logo,

$P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1 \cap B_2)$


$$\begin{aligned} &= P(B_1) + P(B_2) - P(B_1)P(B_2) \text{ (supondo independência)} \\ &= 0,8 + 0,7 - 0,8 \times 0,7 = 0,94. \end{aligned}$$

Outra solução:

$$\begin{aligned} P(B_1 \cup B_2) &= 1 - P((B_1 \cup B_2)^c) = 1 - P(B_1^c \cap B_2^c) = 1 - P(B_1^c)P(B_2^c) \\ &= 1 - [1 - P(B_1)][1 - P(B_2)] = 1 - [1 - 0,8][1 - 0,7] = 0,94. \end{aligned}$$

Fórmula de Bayes

Partição do espaço amostral Uma coleção de eventos B_1, \dots, B_k forma uma partição do espaço amostral se eles são **mutuamente exclusivos** e se sua **união** é igual ao **espaço amostral**



Teorema da probabilidade total Se B_1, \dots, B_k formam uma partição do espaço amostral Ω , então para qualquer evento A em Ω , vale

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + \dots + P(B_k)P(A|B_k) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i).$$

Fórmula de Bayes. Se B_1, \dots, B_k formam uma partição do espaço amostral Ω , e A é evento em Ω com $P(A) > 0$, então

$$P(B_i | A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i)}.$$

Exemplo. Uma montadora trabalha com **dois** fornecedores (A e B) de uma determinada peça. Sabe-se que **10%** e **5%** das peças proveniente dos fornecedores A e B , respectivamente, estão **fora** das especificações. A montadora recebe **30%** das peças do fornecedor A e **70%** de B . Se uma peça do estoque inteiro é escolhida ao acaso,


- calcule a probabilidade de que ela esteja fora das especificações.
- se uma peça escolhida ao acaso está fora das especificações, qual é a probabilidade de que tenha sido fornecida por A ?

Solução. Eventos:

A: "peça selecionada foi fornecida por A",

B: "peça selecionada foi fornecida por B" e

E: "peça selecionada não atende às especificações".



Do enunciado do problema temos $P(A) = 0,30$, $P(B) = 0,70$, $P(E|A) = 0,10$
 $P(E|B) = 0,05$.

(a) **Fórmula da probabilidade total**

$P(E) = P(A)P(E|A) + P(B)P(E|B) = 0,30 \times 0,10 + 0,70 \times 0,05 = 0,065$.

(a) $P(A|E) = ?$

Pela fórmula de Bayes,

$$P(A|E) = \frac{P(A)P(E|A)}{P(A)P(E|A) + P(B)P(E|B)} = \frac{0,30 \times 0,10}{0,30 \times 0,10 + 0,70 \times 0,05} = \frac{0,03}{0,065} = 0,46.$$

A solução do exemplo anterior é facilitada pela **árvore de probabilidades**

